




# โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI




ปัจจุบันมีแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ.2563 การขยายหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาโดยวิธี Primary PCI มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ.2563


ปี 2567




อัตราการได้รับ reperfusion



จำนวนผู้ป่วย STEMI จำแนกประเภทหัตถการ, 2551-2567



จำนวนผู้ป่วย STEMI และสัดส่วนหัตถการ จำแนกเขตสุขภาพ, 2567



## การเสียชีวิตในโรงพยาบาล



ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วย Reperfusion therapy มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา อย่างมีนัยสำคัญ โดยในกลุ่มผู้ที่ได้รับการรักษาแบบ ยาละลายลิ่มเลือดร่วมกับ PCI มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มที่ได้รับ Primary PCI เพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย Reperfusion therapy ในการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วย STEMI ขณะรักษาในโรงพยาบาล

ปี 2565-2567

เพศชาย 11.1% เพศหญิง 17.5%


จำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อปี  
1924 คน/ปี

อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
13.1%



\*การวิเคราะห์อัตราการเสียชีวิตแยกกลุ่มประชากร พิจารณาย้อนหลัง 3 ปี เพื่อลดความแปรปรวนของจำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็ก

อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI จำแนกประเภทเหตุการณ์, 2551-2567



อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI จำแนกตามเหตุการณ์และเขตบริการสุขภาพ, 2565-2567

